

Свет је на ивици биолошке катаклизме услед пандемије ковида 19. Српски здравствени систем је пред потпуним сломом.



Да би се земља консолидовала, предлажем успостављање нове српске стратегије одбране од ковида 19 у следећих 17 тачака:

Распустити постојећи Кризни штаб.

Основати нови Штаб националног спаса против ковид 19 епидемије (Штаб).

Именовати начелника Штаба и помоћнике за поједине области. За здравство именовати једног главног и одговорног помоћника.

У Штаб инкорпорирати једног представника парламентарне и једног представника ванпарламентарне опозиције.

Председник државе не треба да се меша у рад Штаба.

Успоставити Гиулиани метод конференција за новинаре које воде искључиво начелник Штаба и помоћник за здравство.

Конференције се одржавају најмање једном дневно и трају док год има новинарских питања.

Све привремене ковид објекте распустити.

Све зидане болничке објекте у Србији који су претворени у ковид болнице дезинфиковати и претворити у стандардне нековид болнице. Све ковид пацијенте преместити у централне ковид пољске болнице.

Уз помоћ Војске Србије успоставити четири централне пољске ковид болнице у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу неограничених капацитета. Искључиво у њима смештати и лечити једино ковид пацијенте који су животно угрожени. Успоставити јединствени протокол за хоспитализацију и лечење оболелих од ковида 19.

Пацијенти који нису животно угрожени лече се код куће.

Успоставити више десетина 7/24 телефонских линија у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу на којима су дежурни лекари, ради давања савета грађанству о ковиду 19, а који су ограничени на три минута.

Успоставити општи национални споразум о уздржавању од масовних протеста за спас нације од биолошког уништења, све док букти ковид епидемија.

Започети са масовном превенцијом и профилаксом против ковида 19 пробиотицима. Овај јединствени српски приступ заустављању ковид 19 пандемије заснива се на фундаменталним открићима нобеловца Иље Иљића Мећникова из 1908. као и на теоретским и апликативним научним радовима који су објављени у последња три месеца:

Белојевиц Г. Прасхер Д. Муџиц оф Мицробиота Агаинст САРС ЦоВ-2. Едиториал. Ноисе&Хеалтх 2020; 21 (100) 97.

Дхар Д, Моханту А. Гут мицробиота анд Цовид-19 – поссибле линк анд импликационс. Вирус Рес 2020 Ауг; Вол.285

Гасбаррини ет ал. Едиториал. ЦОВИД 19 анд мицробиота: неџ кидс он тхе блокк. Еур Рев Пхармацол Сци 2020 Мау; 5189-5191.

Хе У, Ванг Ј, Ли Ф, Схи У. Маин Цлиницал Феатурес оф ЦОВИД-19 анд Потенциал Прогностиц анд Тхерапеутиц Валуе оф тхе Мицробиота ин САРС-ЦоВ-2 Инфецтионс. Фронт Мицробиол. 2020 Јун 5;11:1302

Акоур А. Пробиотицс анд ЦОВИД-19: ис тхере ану линк? Летт Аппл Мицробиол. 2020 Јун 4:10.1111/лам.13334.

Мак ЈWУ, Цхан ФКЛ, Нг СЦ. Пробиотицс анд ЦОВИД-19: оне сизе доес нот фит алл. Ланцет Гастроентерол Хепатол. 2020 Јул;5(7):644-645.

Превенција се спроводи код здравих, са једним пробиотиком дневно са око 109 ЦФУ млечнокиселинских бактерија Лацтобациллус и Бифидобацтеријум. Профилакса се спроводи код оболелих, са 3×2 пробиотика. Искључиво уз оброк. Ограничити унос

vlakana храном.

Саветовати неселективно ношење маски свим категоријама становништва кад год се прилази људима и у затвореном и у отвореном простору.

Наставити са досадашњим тестирањима и са санитарно-хигијенским мерама.

Омогућити школовање уз стриктно поштовање свих противепидемијских мера.

Омогућити јавна окупљања и спортске манифестације уз стриктно поштовање противепидемијских мера. За све важе иста правила: носити стално маску, не љубити се, не грлити се, не уносити се у лице, прати редовно руке и дезинфиковати их потом 70% алкохолом.

(Аутор је редовни професор Медицинског факултета у Београду)

(Данас)